



Endoscopy Preparation

UPPER ENDOSCOPY:

Este procedimiento se utiliza para diagnosticar y tratar problemas en el tracto gastrointestinal superior. Se realiza utilizando un tubo largo y flexible llamado endoscopio. El tubo tiene una pequeña cámara de luz y video en un extremo, y transmite imágenes a un monitor.

DÍA: _____ FECHA: _____

Cinco (5) días antes del procedimiento:

- Dejar de tomar anticoagulantes o antiplaquetarios, como: Coumadin, Xarelto, Plavix, Pradaxa o Eliquis, si es necesario, solicitaremos un aclaramiento cardíaco.

Día antes del procedimiento:

1. NO COMA NI BEBA NADA **DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE.**

Día del procedimiento:

- Tome los medicamentos para el corazón o la presión arterial recetados actualmente con un sorbo de agua. **No** tome lisinopril.
- Todos los demás medicamentos se pueden reanudar después de su procedimiento.
- Es posible que tenga líquidos claros hasta las 7:30 a.m. solo si su procedimiento está programado después de la 1:30 p.m.
- **Si usted es diabético:** Para evitar un nivel peligrosamente bajo de azúcar en la sangre, no tome su medicamento para la diabetes (píldoras o insulina) la mañana de su procedimiento. Puede reanudar sus medicamentos para la diabetes después del procedimiento una vez que haya comido.
- Planee estar en la instalación durante aproximadamente 2 horas.
- Un conductor debe acompañarlo a la instalación.
- **NO** se le permitirá conducir o tomar un taxi.
- Sin productos de tabaco: **NO SUMERJA** el día de su procedimiento
- No hay dulces, chicles o mentas dentro de las 2 horas de su hora de llegada.