



Golytely Bowel Preparation for a Colonoscopy

FROM PHARMACY: PICK UP GOLYTELY PREP PRESCRIPTION

COLONOSCOPY:

In order to achieve una evaluación precisa de su tracto gastrointestinal inferior (GI), es importante que se prepare adecuadamente para el procedimiento. Los médicos pueden obtener la visión más clara del intestino cuando se enjuaga completamente libre de material de desecho. La minuciosidad de esta limpieza intestinal depende de ti. Sin su cooperación, el examen no puede lograr su propósito y puede tener que repetirse.

DÍA: _____ FECHA: _____

Cinco (5) días antes del procedimiento:

Deje de tomar anticoagulantes o anticoagulantes, como: Coumadin, Xarelto, Plavix, Pradaxa o Eliquis. (Se requiere aclaramiento cardíaco antes de los procedimientos programados)

El día antes de su procedimiento, comenzará la **DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA**

NO HAY LÍQUIDOS QUE CONTENGAN COLORANTES ROJOS O ALIMENTOS SÓLIDOS

Puede beber el siguiente hasta 8 horas antes del procedimiento:

- SOPA DE CARNE DE RES O POLLO
- BOUILLION JUGO DE MANZANA
- JUGO DE UVA BLANCA
- JUGO DE ARÁNDANO
- BLANCO GELATINA O PALETAS (Verde/Amarillo Solamente) GATORADE (solo amarillo)
- SODAS (SPRITE/MOUTAIN DEW/7UP) GINGER ALE LIMONADA FLOZEN DE AGUA CON SABOR A AGUA

No coma ni beba lo siguiente el día anterior/día del procedimiento: SIN CAFÉ - SIN TÉ - SIN BEBIDAS CARBONATADAS OSCURAS - SIN ALCOHOL - SIN FUMAR

1. A las 5 p.m. de la noche antes de su procedimiento, comience a beber la 1ª mitad de Golytely Prep bebiendo 8 oz cada 15 minutos hasta que todo desaparezca. CONTINÚE CON LOS LÍQUIDOS CLAROS HASTA LA MEDIANOCHE.
2. 4-5 horas antes de su procedimiento comience a beber la 2ª mitad de Golytely Prep bebiendo 8 oz cada 15 minutos hasta que todo desaparezca. BEBA SOLO UN VASO DE AGUA DE 24 OZ DESPUÉS DE QUE TERMINE LA PREPARACIÓN. POR FAVOR, SIGA SIENDO NPO DESPUÉS DE ESE ÚLTIMO VASO DE AGUA. DEBE SER MÁS DE 2 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO.

DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE ANTES DE SU PROCEDIMIENTO, NADA QUE COMER O BEBER , INCLUYENDO CHICLES Y

NO FUMAR O FUMAR TABACO SIN HUMO O SU PROCEDIMIENTO SERÁ REPROGRAMADO.

USTED SERÁ SEDADO, POR LO QUE DEBE TENER A ALGUIEN QUE LO LLEVE A CASA DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO.

Si desarrolla alguno de los siguientes síntomas después de su procedimiento y no puede llegar a la oficina, deberá ir a la **SALA DE EMERGENCIAS DEL CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO SOLAMENTE.** Si vive fuera de Lubbock, vaya a la sala de emergencias más cercana .**DOLOR ABDOMINAL INTENSO , FIEBRE, SANGRADO RECTAL O VÓMITOS DE SANGRE**

LOS RESULTADOS NO SE DAN POR TELÉFONO

4505 82nd Street, Suite 5 | Lubbock, TX 79424 | 806-696-4440 | LubbockGastro.com