



SuTab Colonoscopy Prep

Recoja la receta de su farmacia:

No siga las instrucciones en la parte posterior de su SuTab Box, ya que son incorrectas.

COLONOSCOPIA:

Para lograr una evaluación precisa de su tracto gastrointestinal inferior (GI), es importante que se prepare adecuadamente para el procedimiento. Los médicos pueden obtener la visión más clara del intestino cuando se enjuaga completamente libre de material de desecho. La minuciosidad de esta limpieza intestinal depende de ti. Sin su cooperación, el examen no puede lograr su propósito y puede tener que repetirse.

DÍA: _____ FECHA: _____

Cinco (5) días antes del procedimiento:

Deje de tomar anticoagulantes o anticoagulantes como: Coumadin, Naprosyn, Nuprin, Persantine, Plavix, Relafen, Rufen.

Día antes del procedimiento:

Deberá seguir una dieta líquida clara durante todo el día. Los artículos incluyen: jugos claros sin pulpa, soda clara, caldo de pollo o carne, paletas, gelatina, té, etc. Si usted es diabético, beba líquidos regulares (no dietéticos) con moderación durante todo el día.

Evite los líquidos de color oscuro, los productos lácteos y los jugos de naranja.

12 horas antes de su procedimiento: **Día 1 – Dosis 1**

- Paso 1: Abra 1 frasco de 12 tabletas
- * Paso 2: Llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada tableta con un sorbo de agua y beba la cantidad completa durante 15-20 minutos
 - Si se siente incómodo, tome las tabletas y el agua más lentamente
- Paso 3: Aproximadamente 1 hora después de tragar la última tableta, llene el recipiente provisto por segunda vez con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.
- Paso 4: Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, llene el recipiente provisto con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba la cantidad total durante 30 minutos.

Noche antes del procedimiento:

8 horas antes de que comience la colonoscopia **Día 2 – Dosis 2** no antes de 4 horas después de comenzar la Dosis 1

- Repita el Paso 1 al Paso 4 desde el Día 1 – Dosis 1 usando la segunda botella de tabletas
- **Importante: Debe usar todas las tabletas y agua al menos 2 horas antes de la colonoscopia**

Día del procedimiento:

- Tome los medicamentos para el corazón o la presión arterial recetados actualmente con un sorbo de agua. **No** tome lisinopril.
- Si usted es diabético: Para evitar un nivel peligrosamente bajo de azúcar en la sangre, **no** tome su medicamento para la diabetes (píldoras o insulina) la mañana de su procedimiento. Puede reanudar sus medicamentos para la diabetes después del procedimiento una vez que haya comido.
- * Es posible que tenga líquidos claros hasta las 7:30 a.m. **SOLO SI SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO DESPUÉS DE LA 1:30 p.m.**
 - Planee estar en las instalaciones durante aproximadamente 2 horas.
 - Un conductor debe acompañarlo para llevarlo a casa después de su procedimiento. Usted será sedado para su colonoscopia y estará somnoliento durante varias horas después del procedimiento. No puede conducir ni trabajar durante 12 horas después del procedimiento. **NO SE LE PERMITIRÁ CONDUCIR NI TOMAR UN TAXI.**